Maprelin® XP-10
Péforéline 75 µg/mL

Composition: Chaque mL contient 75 ug/ml Péforéline (ingrédient actif) et 1 mg/ml chlorocrésol (conservateur)
Espèce cible: Porcine
Indications:
Pour déclencher le cycle oestral chez les truies suite au sevrage des porcelets, et pour déclencher le cycle oestral chez les cochettes sexuellement matures qui ont reçu un traitement d'inhibition de l'oestrus par des progestagènes.
Posologie et mode d'administration:
La dose de péforéline à administrer par animal dépend de son degré de parité:
Truies primipares:
24 heures après le sevrage des porcelets: 37,5 µg de péforéline (0,5 mL de solution) par voie intramusculaire
Truies multipares:
24 heures après le sevrage des porcelets: 150 µg de péforéline (2,0 mL de solution) par voie intramusculaire
Cochettes:
48 heures après l'arrêt du traitement destiné à inhiber l'oestrus: 150 µg de péforéline (2,0 mL de solution) par voie intramusculaire
Administrer une injection unique intramusculaire.
Un système de seringue automatique peut être utilisé avec les flacons de 50 ml et de 100 ml.
Contre-indications:
• Ne pas utiliser chez les cochettes prépubères.
• Ne pas utiliser en cas d'infertilité
• Ne pas utiliser en cas de troubles généraux de la santé.
• Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'ingrédient actif ou à l'un des excipients.
Précautions:
• L'innocuité du produit n'a pas été démontrée chez les truies et les cochettes lors de la gestation et de la lactation. Des études de laboratoire effectuées sur les souris ont mis en évidence des effets tératogènes. Ne pas utiliser Maprelin chez des animaux en gestation et pendant la lactation.
• Le traitement simultané de ce produit avec la Gonadotrophine sérique de jument gravide (PMSG) ou la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) risque d'entraîner une réaction excessive des ovaires.
Mises en garde:
• Un délai d'attente n'est pas requis pour les porcs quand les directives de l'étiquette sont suivies.
• Le produit pourrait provoquer une irritation et une sensibilisation de la peau.
• Les personnes ayant une hypersensibilité connue aux analogues de la GnRH ou à l'un des excipients ne doivent pas administrer le médicament vétérinaire.
• En raison de la foetotoxicité des analogues de la GnRH démontrée lors d'études de laboratoire, et qu'une injection accidentelle ne peut pas toujours être évitée, le médicament vétérinaire ne doit pas être administré par des femmes enceintes.
• Les femmes en âge de procréer doivent faire preuve d'une grande prudence lorsqu'elles administrent ce produit.
• La prudence est de mise pour éviter une auto-injection accidentelle.
• En cas d'auto-injection accidentelle, consulter immédiatement un médecin et lui montrer la notice ou l'étiquetage du produit.
• En cas de contact accidentel avec la peau, la zone affectée doit être lavée soigneusement avec de l'eau et du savon. En effet, les analogues de la GnRH peuvent être absorbés à travers la peau intacte.
• En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau.
• Garder hors de la portée des enfants.
Entreposage : Entreposer à une température entre 2 °C et 8 °C. Éviter le gel. Garder à l'abri de la lumière. Jeter le produit inutilisé 28 jours après avoir percé le flacon pour la première fois.
Présentation : MAPRELIN XP-10 est offert en flacons à doses multiples de 10 ml, 50 ml, et de 100 ml.

Voir la notice d'emploi pour l'information complète

Modern Veterinary Therapeutics · 14343 SW 119th Avenue · Miami, FL 33186 · USA
Phone 888-590-9839 · Fax 305-503-8585 · E-Mail info@modernveterinarytherapeutics.com
www.ModernVeterinaryTherapeutics.com

Maprelin® XP-10
Péforéline 75µg/mL

NOUVEAU!

VDD Approuvé

DIN 02465078

GnRH synthétique



- Substance active produite synthétiquement
- Développé seulement pour l'espèce porcine
- Stimulation fiable de l'oestrus
- Indice du porcelet plus élevé
- Gain de poids plus important du porcelet

Modern Veterinary Therapeutics

Tel: 888-590-9839
www.ModernVeterinaryTherapeutics.com
info@modernveterinarytherapeutics.com

PASSION FOR VETERINARY INNOVATIONS
PASSION POUR LES INNOVATIONS VETERINAIRES

Maprelin® XP-10
Péforéline 75 µg/mL

À propos de Maprelin XP-10:

Maprelin XP-10 contient la péforéline, un nouveau analogue synthétique de la gonadoréline (GnRH), qui stimule de façon sélective la libération de l'hormone folliculostimulante (FSH) dans l'espèce porcine sans affecter le pic de l'hormone lutéinisante (LH). Il en résulte une meilleure croissance du follicule et un déclenchement prévisible de l'oestrus .

Indications:

Pour déclencher le cycle oestral chez les truies suite au sevrage des porcelets, et pour déclencher le cycle oestral chez les cochettes sexuellement matures qui ont reçu un traitement d'inhibition de l'oestrus par des progestagènes.

Bénéfices:

- Un interval plus court entre le sevrage et l'oestrus
- Un taux de grossesse supérieur
- Un taux de mise bas supérieur
- Plus de porcelets
- Un gain de poids plus rapide du porcelet

- Ingrédient actif produit synthétiquement

- Pas de problèmes d'ordre éthique ni du bien être de l'animal contrairement aux hormones naturelles (par exemple: PMSG & eCG) obtenues par l'induction d'avortement des juments.
- Pas de variation d'un lot à l'autre contrairement à la production d'hormones naturelles

- Solution prête à l'emploi

- Pas de mélange et moins de déchets liés à l'emballage
- Flacons multi-doses

- Petit volume d'injection (0,5 mL - 2 mL)

- Longue durée de conservation


- Peut être utilisé jusqu'à 28 jours après la première utilisation

- Petite taille de la péforéline


- Pas d'immunisation après utilisations répètées

- Zéro temps d'attente

LE CHOIX ÉTHIQUE



Vangroenweghe et al. - Porcine Health Management (2016) 2:1
F Vangroenweghe, L Gossens, J Jourquin - Proceedings du congrès IPVS (2014)



J Jourquin - Proceedings du congrès APVS (2011)

PASSION FOR VETERINARY INNOVATIONS
PASSION POUR LES INNOVATIONS VETERINAIRES